

# BORDEAUX zweizeilig

Neue Ertragsklasse im Zweizeilersortiment



## Vorteile:

- äußerst leistungsfähig mit sehr hoher Anpassungsfähigkeit und Ertragsstabilität
- Kornertrag bundesweit 6 % über California in Stufe 2, 3 % in Stufe 1; noch höher ist die Ertragsüberlegenheit in Süddeutschland!
- Auffallend vital und bestockungsfreudig: BORDEAUX kombiniert mittlere Reife und Standfestigkeit mit ausgezeichneter Knickfestigkeit bei mittlerer Blattgesundheit.
- großes Korn mit sehr hohem Marktwareanteil (98 %) und hohem Hektolitergewicht (68 kg/hl)

## Anbau:

Universalsorte für alle Standorte, besonders lohnend ist eine gezielte Fungizidstrategie gegen Zwergrost und Ramularia. Im Hinblick auf die herausragende Ertragsleistung bei mittlerer Blattgesundheit empfiehlt sich BORDEAUX für eher intensivere Anbauverfahren.

## Kurzprofil:

---- = sehr niedrig/früh/kurz,

++++ = sehr hoch/spät/lang

### Entwicklung

Druschreife



### Vitalität

Winterfestigkeit



Trockentoleranz



Standfestigkeit



Knickfestigkeit



### Gesundheit

Blattgesundheit



### Qualität

Marktware



Hektolitergewicht



# BORDEAUX zweizeilig

Neue Ertragsklasse im Zweizeilersortiment

## Entwicklung:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Entwicklung          | Mittlere Reife nach sehr vitaler Jugendentwicklung |
| Ährenschieben        |  |
| Druschreife          |  |
| Pflanzenlänge        |  |
| Ähren/m <sup>2</sup> |  |
| Körner/Ähre          |  |
| TKM                  |  |

## Vitalität:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Winterfestigkeit     |  |
| Trockentoleranz      |  |
| Standfestigkeit      |  |
| Knickfestigkeit Halm |  |
| Knickfestigkeit Ähre |  |

## Gesundheit:

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Gesundheit          | Knapp mittlere Blattgesundheit |
| Gelbmosaik          | ja                             |
| Rhynchosporium      |                                |
| Ramularia           |                                |
| Zwergrost           |                                |
| Netzflecken         |                                |
| Mehltau             |                                |
| undef. Blattflecken |                                |

## Qualität:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Qualität              | Zweijährig hohe Hektolitergewichte bei guter Sortierung |
| Marktware             |   |
| Vollgerste            |   |
| Hektolitergewicht     |   |
| Eiweißgehalt (Futter) |   |

# BORDEAUX zweizeilig

## Neue Ertragsklasse im Zweizeilersortiment

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Anbauregionen                 | Alle Standorte   |
| Saatzeittoleranz (zweizeilig) | früh, z.B. 20. September~etwas später, z.B. Anfang Oktober |

### Aussaat (Körner/m<sup>2</sup>):

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Saatstärke (Körner/m <sup>2</sup> ) | Ortsüblich in Abhängigkeit von Saatzeit, Standort und Bestellbedingungen |
| frühe Saat (zweizeilig)             | etwas geringer, z.B. 220-240   |
| mittlere Saat (zweizeilig)          | ortsüblich, z.B. 260-280   |
| späte Saat (zweizeilig)             | etwas erhöht, z.B. 320-360   |

### N-Düngung:

schossbetont : Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 190 (Vorfrucht Getreide, sehr hohes Ertragsniveau)

#### Herbstgabe

bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen (nach Getreide bis 1. Okt. 20 – 40, organisch bis 30 NH4)

#### Startgabe

EC 13 - 25: 80 - 90 inkl. N<sub>min 0-30</sub> mit 10 - 20 S zu Vegetationsbeginn

#### Schossgabe

EC 30 - 31: 60 - 80 inkl. N<sub>min 30-90</sub>, üppige Bestände EC 32

#### Spätgabe

EC 39 - 49: 30 – 40, Trockenstandorte EC 39

### Wachstumsregler im Intensivanbau:

|                 |                          |                           |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| Wachstumsregler | <b>etwas höher, z.B.</b> |                           |
|                 | EC 29/30                 | 0,3 Moddus Start/Moddevo  |
|                 | +                        |                           |
|                 | EC 31/32                 | 0,3 - 0,6 Moddus          |
|                 | EC 39/49                 | 0,2 - 0,4 Cerone/Camposan |

#### Hinweise zum Pflanzenschutz

Im Hinblick auf die herausragende Ertragsleistung bei knapp mittlerer Blattgesundheit empfiehlt sich BORDEAUX für eher intensivere Anbauverfahren mit einer gesplitteten bzw. zweigeteilten Fungizidstrategie.

# BORDEAUX zweizeilig

Neue Ertragsklasse im Zweizeilersortiment

## Wertprüfung BORDEAUX vs. California

### BORDEAUX in der Wertprüfung



2017-2019, Qualität

|                         | BORDEAUX | California |
|-------------------------|----------|------------|
| Hektolitergewicht kg    | 68,5     | 67,0       |
| TKM                     | 43,9     | 42,6       |
| Proteingehalt % TM      | 10,9     | 11,8       |
| Sortierung > 2,2 mm     | 98,0     | 95,5       |
| Marktwareertrag dt/ha   | 96,8     | 90,2       |
| Marktwareanteil relativ | 108,6    | 101,2      |

VRS = 100 % = KWS Meridian, California, KWS Liga, 3-jährig  
Quelle: nach Angaben des Bundessortenamtes

© nach Daten des Bundessortenamtes

## Ertragsleistung

### BORDEAUX in der Wertprüfung



Kornerträge relativ, 2017-2019, n=38



VRS = 100 % = KWS Meridian, California, KWS Liga, 3-jährig Quelle: Daten der Wertprüfung, Auszug

© Wertprüfung, Auszug