

# TYBALT<sup>A</sup>

Spitzenerträge Jahr für Jahr



## Vorteile:

- Langjährig stabil hohe Kornerträge
- Kurzstrohiger Einzelährentyp mit hohem TKG
- Mittel standfest und blattgesund

## Anbau:

Für den ertragsorientiert intensiven Anbau auf allen besseren Böden  
Regionen und Anbauverfahren mit gesunder Abreife  
Bei feuchter Blüte gezielte Ährenbehandlung mit Azol

## Kurzprofil:

---- = sehr schlecht/früh/kurz,

++++ = sehr gut/spät/lang

### Entwicklung

Druschreife



### Vitalität

Trockentoleranz



Standfestigkeit



Blattgesundheit



### Gesundheit

Fusariumresistenz



### Qualität

Fallzahlstabilität



Rohproteingehalt



# TYBALT A

## Spitzenerträge Jahr für Jahr

### Entwicklung:

Ährenschieben	
Druschreife	
Pflanzenlänge	
Ähren/m²	
Körner/Ähre	
TKM	

### Vitalität:

Trockentoleranz	
Standfestigkeit	

### Gesundheit:

Mehltau	
Gelbrost	
Braunrost	
Blattseptoria	
Fusariumresistenz	

### Vermarktung:

Vermarktung	Sehr sichere und attraktive A-Qualität
Fallzahl	
Fallzahlstabilität	
Rohproteingehalt	
Sedimentationswert	

Kornertrag hohe bis sehr hohe Kornerträge

### Verarbeitung:

Volumenausbeute	
Mehlausbeute	
Wasseraufnahme	

# TYBALT A

## Spitzenerträge Jahr für Jahr

Anbauregionen

Bessere Böden, Regionen/Anbauverfahren mit gesunder Abreife

### Aussaat (Körner/m<sup>2</sup>):

Saattermin

Von sehr früh bis spät, möglichst früh bis Mitte April

### Saatstärke (abhängig von den Aussaatbedingungen):

Frühjahrsaussaat

Frühe Saat (Anfang März): ortsüblich, z. B. 370 - 380 Kö/m<sup>2</sup>  
Mittlere Saat (Ende März): ortsüblich, z. B. 380 - 400 Kö/m<sup>2</sup>  
Späte Saat (Mitte April): ortsüblich, z. B. 400 - 420 Kö/m<sup>2</sup>

### N-Düngung:

standortüblich : Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 210 (Blattvorfrucht, sehr hohes Ertragsniveau)

#### Startgabe

EC 13 - 25: 80 - 100 inkl. N<sub>min 0-30</sub> mit 10 - 15 S zu Vegetationsbeginn

#### Schossgabe

EC 30 - 31: 60 - 70 inkl. N<sub>min 30-60</sub>, üppige Bestände EC 32

#### Spätgabe

EC 49 - 59: 50 - 60 (mit 10 - 15 S), Trockenstandorte EC 39

### Wachstumsregler, z. B. l/ha:

Frühjahrsaussaat

Als kurze Sorte sollte Tybalt vorsichtig eingekürzt werden  
z.B. 0,3 CCC + 0,15 Moddus Start in EC 29

Hinweise zum Pflanzenschutz

EC 32/37 bei sehr hohem Septoriadruck  
EC 47/51 Breitbandfungizid ODER  
EC 61/63 Azolpräparat gegen Fusariosen